PILULES D'IODE
PILULES D'IODE
130 MG
comprimé factice
NE PROTÈGE PAS DE TOUTES LES RETOMBÉES D'UN ACCIDENT NUCLÉAIRE
PHARMACIE CENTRALE DU RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE - SORTIRDUNUCLEAIRE.ORG
PILULES D'IODE
FACTICE
CONSEILS D'UTILISATION
Ceci est une boite factice (susceptible de contenir de simples bonbons). Nous la distribuons afin de sensibiliser les populations vivant autour des centrales nucléaires au caractère dérisoire de la protection offerte par les pastilles d'iode en cas d'accident nucléaire.
Ces pastilles d'iode saturent la thyroïde en iode stable afin d'éviter l'incorporation d'iode radioactif nocif pour la santé émis en cas d'accident nucléaire.
La prise de comprimés d'iodure de potassium doit s'effectuer entre 2 et 48 heures AVANT l'accident pour un maximum d'efficacité (sic).
Pensez-vous vraiment qu'on vous préviendra aussi tôt ?
Le périmètre de distribution de ces pastilles est désormais de 20 km autour des installations.
Pourtant, les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima ont montré que le nuage radioactif rejeté par un accident peut se déplacer sur des centaines de kilomètres !
L'iode ne vous protège pas des effets nocifs des centaines d'autres éléments radioactifs potentiellement émis dans l'atmosphère par le panache d'une catastrophe nucléaire.
Pour en savoir plus consultez le tract à l'intérieur.
sortirdunucleaire.org/iode2019
Partie à coller - merci !
FACTICE

PILULES D'IODE
PILULES D'IODE
130 MG
comprimé factice
NE PROTÈGE PAS DE TOUTES LES RETOMBÉES D'UN ACCIDENT NUCLÉAIRE
PHARMACIE CENTRALE DU RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE - SORTIRDUNUCLEAIRE.ORG
PILULES D'IODE
FACTICE
CONSEILS D'UTILISATION
Ceci est une boite factice (susceptible de contenir de simples bonbons). Nous la distribuons afin de sensibiliser les populations vivant autour des centrales nucléaires au caractère dérisoire de la protection offerte par les pastilles d'iode en cas d'accident nucléaire.
Ces pastilles d'iode saturent la thyroïde en iode stable afin d'éviter l'incorporation d'iode radioactif nocif pour la santé émis en cas d'accident nucléaire.
La prise de comprimés d'iodure de potassium doit s'effectuer entre 2 et 48 heures AVANT l'accident pour un maximum d'efficacité (sic).
Pensez-vous vraiment qu'on vous préviendra aussi tôt ?
Le périmètre de distribution de ces pastilles est désormais de 20 km autour des installations.
Pourtant, les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima ont montré que le nuage radioactif rejeté par un accident peut se déplacer sur des centaines de kilomètres !
L'iode ne vous protège pas des effets nocifs des centaines d'autres éléments radioactifs potentiellement émis dans l'atmosphère par le panache d'une catastrophe nucléaire.
Pour en savoir plus consultez le tract à l'intérieur.
sortirdunucleaire.org/iode2019
Partie à coller - merci !
FACTICE